

Blütenmonilia

Infektionen können schon kurz VOR der Blüte stattfinden! Früh genug mit Schutz anfangen.



IP / ÖLN

- 1. Behandlung VOR Blühbeginn
- 2. Behandlung ca. 1/3 offenen Blüten
- Eine dritte Behandlung ist nur in Extremfall nötig
- Fungizide der Gruppe "Anilinopyrimidine" (z.B. Chorus) in den Kirschen NICHT bewilligt

BIO

- Kulturen mit Regendach abdecken
- Kaliumbicarbonat + Netzschwefel (Teilwirkung)
- Befallenen Blütenbüschel, Triebe und Fruchtmumien entfernen

Monilia und Schrottschuss Strategie bei den Zwetschen

B	52	E	59	F	65	H	71	Mitte Juni	Mitte Juli	Farbumschlag	Fruchtausreife			
Delan Kupfer		Rostmilben und Fruchtdeformationen Netzschwefel 4 x 4 kg/ha Ab Beginn Blüte bis Ende Mai												
Maximal 3 Behandlungen bei Solo-Anwendung oder max. 5 Anwendung bei reduzierter Aufwandmenge in Tankmischung wie z. B. mit SSH-Fungizide Dithianon: Delan WG ⁴⁾ , Legan ⁴⁾ , Atollan ⁴⁾ , Rucolan ⁴⁾ Narrenkrankheit, Schrottschuss, Sprühfleckenkrankheit, Zwetschenrost														
Phtalimide: Captan ³⁾ , Malvin ³⁾ , Folpet Schrottschuss														
Anilino-Pyrimidine (*) Chorus ⁵⁾ , Switch ⁵⁾ , Avatar ⁵⁾ In Tankmischung mit Delan Blüten- und Zweigdürre (Monilia)						Maximal 3 Behandlungen Switch ⁵⁾ , Avatar ⁵⁾ Fruchtmonilia, Zwetschenrost ⁵⁾ (5) Vorteilhaft in Tankmischung mit Delan								
Maximal 4 Behandlungen SSH Sterolsynthesehemmer Slick, Sico, Divo, Difcor, Bogard, nur in Tankmischung mit Captan ³⁾ od. Delan ⁴⁾ (Dithianon) Blüten- und Zweigdürre, Fruchtmonilia, Schrottschuss, Zwetschenrost												Wartefrist 3 Wochen		
Maximal 3 Behandlungen Strobilurine (*): nur bis Ende Blüte Amistar, Ortiva, Legado, Globaztar, Heritage Flow Blüten und Zweigdürre (Monilia), Schrottschuss														
Maximal 2 bzw. Maximal 3 Behandlungen Strobilurine (*): Flint, Tega, Blüten- & Fruchtmonilia, Schrottschuss, Zwetschenrost												Wartefrist 3 Wochen		
Maximal 2 bzw. Maximal 3 Behandlungen Hydroxyanilide & Pyrazolinone Teldor ²⁾ + Delan ⁴⁾ , Prolectus ¹⁾ + Delan ⁴⁾ Blüten- und Zweigdürre (Monilia), Fruchtmonilia, Zwetschenrost												Bäume mit Abdeckung		
Maximal 3 Behandlungen (zählt als Strobilurinbehandlung) Fluopyram SDHI Moon Privilege 0.0175 % + Flint 0.0175 %, Moon Sensation 0.035 %, Fruchtmonilia, Schrottschuss, Zwetschenrost												Bäume ohne Abdeckung		
Maximal 2 Behandlungen Fluopyram Moon Privilege 0.025 % Fruchtmonilia												Wartefrist 14 Tage		
Maximal 2 bzw. Maximal 3 Behandlungen Hydroxyanilide & Pyrazolinone Teldor ²⁾ , Prolectus ¹⁾ Blüten- und Zweigdürre (Monilia), Fruchtmonilia												Wartefrist 10 Tage		