

Stammtisch Obstbau

Mit unserem "Stammtisch Obstbau" bieten wir Ihnen ab sofort eine einfache, flexible und spontane Möglichkeit zum Austausch, um Ihre Beobachtungen zu teilen, Ihre Fragen zu stellen und die aktuelle Situation zu besprechen.

Wie funktioniert das?

Jeden Donnerstag von 18:00 bis 18:30 Uhr treffen wir uns virtuell am "Stammtisch", wöchentlich von März bis Ende Mai und alle zwei Wochen (gerade) von Juni bis Ende August. Sie müssen sich nicht anmelden oder systematisch teilnehmen, sondern nur auf den untenstehenden Link klicken (zum richtigen Zeitpunkt!), wenn Sie sich an den "Stammtisch Obstbau" setzen möchten. Erster Stammtisch: 21.03.2024

["Stammtisch Obstbau"](#)

Frostbekämpfung

Die Vegetation ist bereits weit fortgeschritten und damit die Gefahr von Frost und Frostschäden hoch.

Frostanfälligkeit von Kulturen in Abhängigkeit vom phänologischen Stadium

Stadien BBCH	Knospen- aufbruch	Grünknospe Weiss Punkt	Rotknospe Ballon	Blüte	Abgehende Blüte	Ende Blüte 69	Nachblüte Fruchtfall
	53-54	55-56	57-59	60-67	67		71
Aprikose	● - 4 °	- 3.5 °	- 3 °	- 2.2 °	- 1.2 °	- 0.5 °	- 0.5 °
	● - 6.2 °	- 4.9 °	- 4.3 °	- 2.9 °	- 2.7 °		
Apfel	● - 4 °	- 3.5 °	- 2.2 °	- 2 °	- 1.8 °	- 1.6 °	- 1.6 °
	● - 5.5 °			- 2.2 °	- 2.2 °	- 2.2 °	- 2.2 °
Birne	● - 6 °	- 4.5 °	- 2.8 °	- 2 °	- 1.6 °	- 1.5 °	- 1 °
	● - 6.7 °	- 5 °	- 3.3 °	- 2.8 °	- 2.2 °	- 2.2 °	
Kirsche	● - 4 °	- 3.5 °	- 2.2 °	- 1.7 °	- 1.1 °	- 1.1 °	- 1 °
	●		- 2.7 °	- 2.4 °	- 2.1 °		
Pfirsich	● - 4 °	- 3.3 °	- 2.8 °	- 2.2 °	- 1.8 °	- 1 °	- 1 °
	● - 6.1 °	- 3.9 °	- 3.3 °	- 2.7 °	- 2.2 °		
Zwetschge	● - 4 °	- 3 °	- 2.8 °	- 2 °	- 1.5 °	- 1 °	- 0.5 °
	● - 6.6 °	- 3.3 °	- 2.8 °	- 2.2 °	- 2.1 °		

Kritische Schwelle: ● 10% Schaden: ●

[Massnahmen gegen Frost](#)

[Frostbekämpfung im Obstbau](#)

Im Visier haben

Schorf: Der Regen der letzten Tage könnte zu erheblichen Infektionen geführt haben und für das Ende der Woche sind Regenfälle mit hohen Temperaturen angekündigt. Beachten Sie regelmässig die Schorfprognose ([Agrometeo](#), [RIMpro](#)) und halten Sie sich an einen lückenlosen Schutz.

Vorblüte: Die Vegetation entwickelt sich schnell und das Ballonstadium (Steinobst) und Grünknospenstadium (Kernobst) könnten bald erreicht werden. Im Visier haben:

- 1. Monilia-Behandlung (siehe Strategien [Kirschen](#) und [Zwetschgen](#))
- Echter Mehltau bei sensibel Anlagen und Sorten
- Birnenblütenbrand
- Frostspanner-, Schalenwickler-Bekämpfung (siehe Obstbau aktuell n°8)
- Blattläusebekämpfung
- Sägewespe: kurz VOR der Blüte weisse Fallen (Rebell BIANCO) aufhängen