Empfohlene Pflanzenschutzmittel im Verarbeitungsgemüse für die Saison 2024

Buschbohnenanbau

In Zusammenarbeit der SCFA (Swiss Convenience Food Association) und des VSGP (Verband Schweizer Gemüseproduzenten)

Problem	 Auflaufen	 Bildung der Laubblätter	 Bildung der Blütenknospen	**Bemerkungen**
Schnecken	Schneckenkörner (Metaldehyd)			Nur Randpartien und betroffene Stellen behandeln. Aufwandmengen gemäss Firmenangaben
Unkraut im Vorauflauf	Cargon S, Clomastar 0.25 (Clomazone) + Successor 600 2.0 (Pethoxamid) Colzaphen, Rodino ready 3.0 (Pethoxamid + Clomazone) + Spectrum Loper, Mazil, 1.2 -1.4 (Dimethenamid-P)			Falls bei der Saat feuchte Bodenbedingungen herrschen. Nachverunkrautung überwachen und evtl. Nachauflaufmittel einsetzen. Anwendung bis max. 2 Tage nach der Saat
Allgemeine Empfehlung		**Bentanzon Produkte** nicht IPS Basagran SG, Effican SG, Kusak SG, Pedian SG 0.5-0.8 (Bentazon)		Zum Schutz von Grundwasser nicht mehr als 0.96 kg des Wirkstoffs Bentazon = 1.1 kg /ha der Bentanzon Produkte auf derselben Parzelle innerhalb von 2 Jahren anwenden.
Unkraut im Nachauflauf		Bolero 0.8 -1.0 (Imazamox) Bolero 0.6 – 1.0 Mit oder ohne *Bentanzon Produkte* (Imazamox + Bentazon)		Bei Splittbehandlung 2 x 0.6 - 0.8 anwenden. Gute Amarantwirkung Untere Dosierung bei Splittbehandlung. 2. Splitt bei Neuauflauf insofern nötig.
Raps (Keimblatt)	Bentanzon Produkte ($^{1}/_{2}$ der Aufwandmengen)			Raps muss im Keimblattstadium bekämpft werden. Unabhängig vom Stadium der Bohnen.

Rückseite beachten

Problem	 Bildung der Laubblätter	 Bildung der Blütenknospen	 Beginn Blüte	 Fruchtent-wicklung	**Bemerkungen**
Gräser, Hirsen	Focus Ultra, Ruga 1.0 - 2.0 (Cycloxydim) Select 0.5-1.0 (Clethodim)+ Herbizidöl 0.5 l				Ab Zweiblattstadium der Hirsen. Auch Teilflächenbehandlung möglich. **Wartefrist: 4 Wochen** Select: Letzte Behandlung vor der Blüte.
Botrytis, Sclerotinia	**In mastigen Beständen**	Fezan, 1.0 (Tebuconazole)			Nur in frohwüchsigen Beständen zur Erhöhung der Standfestigkeit einsetzen. **Wartefrist: 3 Wochen**
	Vermeidung von Resistenzen: Damit Moon uns noch jahrelang erhalten bleibt sollte es, wenn möglich, nur einmal pro Jahr eingesetzt werden. **1. Behandlung** Espiro, Papyrus, Pyrus 400 SC, Switch, Avatar Bei entsprechender Witterung und **sehr hohem** Sclerotiniadruck oder einmaligem Moon Einsatz	Espiro, Papyrus, Pyrus 400 SC 2.0 (Pyrimethanil) Switch, Avatar 0.8 (Fludioxonil, Cyprodinil) Moon Sensation 0.8 (Trifloxystrobin +Fluopyram)			Bei normalem Krankheitsdruck oder als Zweitbehandlung nach obigem Einsatz. Maximal 2 Behandlungen pro Kultur. **Wartefristen: 2 Wochen**
	2. Behandlung: Bei sehr hohem Sclerotiniadruck oder notfalls als zweite Moonbehandlung	Moon Privilege 0.5 (Fluopyram)			Max. 2 Moon Behandlungen erlaubt. Unsere Empfehlung: Letzte Behandlung in die Vollblüte **Wartefrist: 7 Tage**
	Wirkstoffwechsel, Spätinfektion			Teldor 1.5 (Fenhexamid)	**Wartefrist: 3 Tage**