

Kirschen 2024

Stadium	Krankheiten / Schädlinge	Mittel	Bemerkungen
 B Knospenschwellen	<u>Austriebsspritzung</u> Kirschenblütenmotte Schrotschuss Ungleicher Holzbohrer	Paraffinöl (Weissöl, Zofal D, Misto 12, Oléoc, Ovitex) St. B-C 3.5 % (56 l/ha), St. D 2 % (32 l/ha) Rapsöl (Braxol, Telmion, Genol Plant) St. B-C 2 % (32 l/ha) Kupfer 0.25 % (max. 4 kg Reinkupfer/ha) Delan u.a. (Dithianon) ^{2,3)} 0.05 % Alkoholfalle „Rebell rosso“	In Schrotschusslagen / bei Gnomoniaproblemen Zur Befallsreduktion ab Ende März 8 Fallen je ha aufhängen. Alkohol alle 2 Tage wechseln/nachfüllen.
 D Knospenaufbrechen	<u>Vor dem Aufblühen</u> Frostspanner Blattläuse Schalenwickler	Audienz ⁵⁾ , Delfin ¹⁾ , Dipel DF ¹⁾⁵⁾ Wormox ¹⁾⁵⁾ , Xentari ¹⁾ Pirimor ¹¹⁾ Pirimicarb ¹¹⁾ Gazelle ¹¹⁾ Oryx Pro ¹¹⁾ Pistol ¹¹⁾ Teppeki ⁴⁾ Capex, Audienz ⁵⁾	Mit der 1. Moniliabehandlung kombinierbar. Vorjahresbefall beachten! Leimringe im Herbst vor Frost anbringen! ¹⁾ Gespinstmottenwirkung ⁵⁾ Frostspanner-, Schalenwickler-Wirkung Schadschwelle 5 % befallene Triebe ¹⁵⁾ Blattlauswirkung
 E Aufblühen (Ballonstadium)	1. Moniliabehandlung kurz vor dem Aufblühen (Ballonstadium)	Fezan ¹³⁾ 0.03 % + Delan (Dithianon) ^{2,3)} Slick, Sico, Bogard 0.02% + Delan ^{2,3,12)} Flint, Tega ¹⁸⁾ 0.025 % ²⁾¹³⁾ Amistar, Ortiva ¹⁰⁾ 0.10 % ²⁾¹³⁾	<u>Morgens oder abends ausbringen!</u> 2) Schrotschusswirkung ¹²⁾ Maximal 4 Behandlungen pro Jahr ! ¹³⁾ Maximal 3 Behandlungen pro Jahr ! ⁴⁾ Maximal 2 Behandlungen pro Jahr ! (ohne Delan keine Schrotschuss- / Bitterfäulewirkung) Blattdünger über die Blütezeit: Goëmar Start, Trapper, Aminosol, Wuxal Amino, Amino Plus
 F Vollblüte	2. Moniliabehandlung Volle bis abgehende Blüte	Mittelwahl wie bei ersten Behandlung mit Schrotschusswirkung oder Amistar, Ortiva ^{2, 10, 13)}	. Evtl. Rötelnbehandlung mit Geramid, Dirigol-N , Phytonic ergänzt mit Harnstoff /Azolon Fluid ¹⁸⁾ Flint, Tega bei Gnomonia
 G abgehende Blüte	Frostspanner bei starkem Befall Schalenwickler Kirschkernstecher	Delfin, Dipel DF, Wormox ¹⁾ , Xentari ¹⁾ Audienz ⁵⁾ Ⓢ	Ⓢ 7-10 Tage nach Abblühen: Audienz ⁵⁾ , Gazelle ¹⁵⁾ , Parexan N ¹⁵⁾ dürften Nebenwirkung haben. Indikation nicht bewilligt. Rücksprache mit der Beratung nehmen. ²⁵⁾ Max 3 Behandlungen, Wartefrist 2 Wochen
 I Schorniggel - Stadium	<u>14 Tage nach der Blüte</u> Schorniggelmonilia und Bitterfäule Blattläuse Monilia Ende Mai–Anfangs Juni	Flint, Tega ^{2, 13, 18)} , Slick 0.02% + Delan 0.03 % ^{2, 12, 18)} Movento SC ⁴⁾ , Pirimor ¹¹⁾ , Gazelle ¹¹⁾ , Oryx Pro ¹¹⁾ , Pistol ¹¹⁾ , Teppeki ⁴⁾ Moon Privilege ²⁵⁾ 0.0175% + Flint 0.0175% ²⁵⁾ Moon Sensation ²⁵⁾ 0.035%	Blattläuse kontrollieren! Jungbäume regelmässig kontrollieren! Schadschwelle 5 % befallene Triebe Monilia-/Bitterfäulebehandlung nach 2 Wochen wiederholen, d.h. weitere 2-3 Behandlungen bis zur Kirschenfliegenspritzung, je nach Witterung E. Mai-A.Juni! Ende Mai Kirschenfliegenfallen montieren! ¹⁸⁾ Wirkung gegen Gnomonia
 J Jungfrüchte bis 3 Wochen vor der Ernte	Kirschenfliege beim Farbumschlag grün auf gelb mit ersten Rotverfärbungen Bitterfäule ²³⁾ + Fruchtmonilia ²³⁾ <u>14 – 10 Tage vor der Ernte</u>	2 x Gazelle ¹¹⁾ , Oryx Pro ¹¹⁾ , Pistol ¹¹⁾ oder Movento SC gegen Kirschenfliege bis 2 Wochen vor Ernte. Gazelle/ Oryx Pro/Pistol ^{11, 20, 22)} 0.02% , Movento SC ^{4, 20, 22)} 0.125% , Moon Privilege ²⁵⁾ 0.0175% + Flint 0.0175% ²⁵⁾ Moon Sensation ²⁵⁾ 0.035% Teldor ⁴⁾ 0.1 % + Delan WG ³⁾ 0.05 % Prolectus ¹³⁾ 0.075 % + Delan WG ³⁾ 0.05 % Netzmittel zusetzen. Moon Privilege ²⁵⁾ 0.0175% + Flint 0.0175% ²⁵⁾ Moon Sensation ²⁵⁾ 0.035% Wartefrist 2 Wochen Moon Privilege ⁴⁾ 0.025 % Wartefrist 2 Wochen Teldor ⁴⁾ 0.1 % , Prolectus ¹³⁾ 0.075 % bei nicht abgedeckten Bäumen bis 10 Tage vor der Ernte einsetzbar	Fallenkontrolle, Warndienst beachten. Gestaffelt nach Sorten behandeln. Spätsorten 10 Tage später, separat behandeln. ²⁰⁾ Wartefrist 2 Wochen. ²²⁾ 2 Behandlungen gegen Kirschenfliege bis 2 Wochen vor Ernte. Kirschesigfliege: Bekämpfung gemäss Allgemeinverfügung BLW. Wichtig ist Zeitspanne ab 2 Wochen vor Ernte und über die Ernte! ³⁾ Delan (Dithianon) max. 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr mit Wirkstoff Dithianon . Bei reduzierter Aufwandmenge in Tankmischung mit anderen Produkten insgesamt max. 5 Behandlungen möglich. ²⁵⁾ Max 3 Behandlungen, Wartefrist 2 Wochen Wartefrist von 10 Tagen mit Teldor, Protectus nur bei nicht abgedeckten Bäumen !
Vor dem ersten Frost ca. Mitte Oktober bis Anfang Januar	Frostspanner	5 m je Anlage (bei ca. 5 - 8 Bäumen) Leimringe anbringen und wöchentlich auszählen	Bezugsquellen: Leu+ Gyax 056 / 201 45 45 Andermatt- Biocontrol 062 / 917 50 05

¹⁰⁾ **Amistar, Ortiva, Legado, Heritage Flow (Azoxystrobin)** nur bis Ende Blüte und nicht bei Kernobst einsetzen (Phytotoxengefahr). Vor Verwendung des Sprüherätes im Kernobst ist dieses gründlich mit zweckmässigem Reinigungsmittel zu spülen.

¹¹⁾ max. 1 Behandlung pro Jahr auf dieselbe Blattlausart, max. 2 Beh./Parzelle/Jahr mit **Gazelle** inkl. **Pistol, Oryx Pro**.