

Tafeläpfel 2024

Stadium	Schorf/Mehltau	Schädlinge	Mittel	Bemerkungen
 B = 52 - C = 53	Ab Stadium B - C Evtl. 1 Behandlung mit Kupfer , dann 1 -2 mal mit Delan¹⁴ oder Captan²⁸ anschließend Dodine⁶ ,	Beim Knospenaufbruch Apfelblütenstecher	Pistol^{6,17,16} 0.02% Gazelle, Oryx Pro^{6,16,17} 0.02% Audienz, Spintor, Elvis 0.02 % Paraffinöl⁸⁾ (Weissöl, Zofal D u.a.) St. B-C 3.5 % (56 l/ha), St. D 2 % (32 l/ha) St. E 1 % (16 l/ha)	Max. 1,5 Kg Reinkupfer pro Jahr Holzbohrerfallen aufhängen 8 Stk. je ha, Alkohol alle 2 Tage wechseln. 8) Grosse Obstbaum-, Austernschildlaus, Rote Spinne, mit Nebenwirkung Blattläuse. Nicht vor Frostnächten behandeln! Nicht mit Delan mischen!
 D = 55	Espiro^{1,23}, Pyrus^{1,23}, Chorus^{1,23}, Frupica^{1,23} oder Faban, Espiro Plus, Ventorex + jeweils Mehltaumittel zusetzen. Bis zum Abblühen. Max. 3 Behandlungen Nach Warndienst !	Rote Spinne gegen Wintereier Blattläuse	Apollo SC² 0.04% Credo² / Nissostar² Pirimor³ 0.04% Oryx Pro^{3,6,16,17} 0.015% ¹⁸ Gazelle, Pistol^{3,6,16,17} 0.015% ¹⁸ Neem Azal⁴ 0.25% Agroneem⁴ 0.25% Tepeki⁶ 0.01 %	1 Kelchfäulewirkung 2 max. 1 x pro Saison 3 max. 1 Behandl. pro Jahr auf dieselbe Art 4 keine Graslauswirkung 18 ab Juli 0.01 %
 E2 = 59 Vor der Blüte	oder bereits ab Stadium E bis 31. Juli Stroby WG^{13,23} oder Flint^{13,23}, Tega^{13,23} (Zusammen gesamthaft 4 Beh. /Jahr) Nach Warndienst !	Frostspanner Vor dem Aufblühen	Zorro^{5,6}, Audienz/Spintor/Elvis Affirm/Rapid/Atac^{5,6,26,30} Affirm/Rapid/Atac^{5,6,30} Audienz/Elvis, Zorro^{5,6,26}	5 Frostspanner- Eulen und Schalenwicklerwirkung 16 Max. 2 Beh. pro Parzelle und Jahr mit Produkten aus der selben Wirkstoffgruppe Sägewespenfallen aufhängen
 F2 = 65 Blüte	Ab Blüte SSH-Mittel²³, Stroby WG^{13,23}, Flint, Tega^{13,23}, Bellis^{7,23}, Sercadis^{7,23}, Rondo Sky^{7,23}, Tofa^{7,23} Bis 31. Juli Gegen Berostungen ab Blüte max. 5 x 4 – 5 kg/ha Netzschwefel¹⁰ zusetzen. Stamina S^{23,27} (max. 6 x) Delan Pro/Norec²⁷ (max. 6 x) Curatio (Schwefelkalk) wird kurativ aufs nasse Laub ausgebracht.	Sofort beim Abblühen Sägewespe Fleckenminiermotte Blutläuse vor Ende Mai	Quassan²⁵ 0,2% Gazelle/Oryx Pro/Pistol^{6,16,17} 0.015% Neem Azal-T/S/Agroneem^{4,29} 0.3% Movento SC^{6,31} 0.125 %	Gegen Kelchfäule : in die Blüte Chorus, Espiro, Frupica 6 max. 2 Behandl. pro Saison 7 max. 3 Behandl. pro Saison 27 gegen Schorf max. 6 x pro Jahr 28 Maximal 10 Anwendungen pro Jahr.
 G = 67 Abblühen	Ab Junifall Captan²⁸, Folpet¹¹ plus Mehltaumittel Nimrod, Topas Vino²⁷ Topas²⁷, Bellis⁷, Moon Experience⁷, Moon Privileg⁷, Cyflamid/ Pican/Cidely⁶ + Netzmittel Nach Hagelschlag sofort : Captan²⁸/Malvin²⁸ oder Flint/Tega +Malvin ausbringen und Abschlussbehandlungen weiterführen.	Blattläuse Rote Spinne	Pirimor^{3,9} ab Juli 0,02 % Gazelle/Oryx Pro/Pistol^{3,6,16,17} 0.015% ¹⁸ Tepeki⁶ 0.01 % Movento SC^{6,31} 0.09 % - 0.125% Apollo SC², Credo^{2,21} Nissostar^{2,21}, Kiron^{2,10,20}, Kanemite^{2,20,30}, Majestik²⁰, Movento SC^{6,21}	23 in Tankmischung mit Captan³⁰ oder Delan¹⁴ 25 Nebenwirkung Fleckenminiermotte 29 Wirkt gegen Miniermotten 17 Blattlauswirkung 31 Wirkung auf Austern- & Kommaschildlaus beim Schlupfbeginn Ende Mai/Anfang Juni. 9 Teilwirkung Kommaschildlaus 14 Pro Parzelle und Jahr nach der Blüte insgesamt nicht mehr als 3400 g des Wirkstoffs Dithianon (Delan, Atollan, Legan u.a.) pro ha anwenden! 10 Rostmilbenwirkung 19 Teilwirkung auf Rostmilben 20 gegen mobile Stadien 21 gegen Larven u. Nymphen
 J = 73	In Feuerbrandgebieten sofortige Behandlung mit max. 2 kg Kupfer 50 % (Berostungsgefahr). In Parzellen mit geringeren Schäden (Tafelobst noch möglich) max. 0.3 kg Kupfer 50 % behandeln. Bis 31. Juli	Blutläuse Kl. Frucht-/Apfelwickler Anfangs Juni Warndienst beachten	Pirimor 0,04 % bei Temp. über 22°C. Netzmittel zusetzen, (2 Beh. im Abstand von 10-14 Tagen) Movento SC⁶ 0.125 % Affirm/Rapid/Atac^{12,15,22,30} 0.0.2%, Prodigy^{12,24} 0.04%	11 Folpet nicht bei Birnen ! 26 max. 4 Behandlung pro Jahr 30 nur in Obstanlagen
	Abschlussbehandlung 2 - 3 Behandlungen im August bis 3 Wochen vor der Ernte, Captan²⁸, Folpet, Bellis^{6,13} <small>Netzmitte zusetzen.</small> Flint¹³, Tega¹³ ohne Netzmittel! Flint¹³, Tega¹³, Bellis⁶ nur in Mischung mit Captan³⁰ oder Folpet <small>max. 1 Abschlussbehandlung. (zählt als SSH-Beh.)</small> Moon Experience <small>(zählt als SSH-Beh.)</small> Bellis⁶ <small>(zählt als Strobilurin)</small> max. 2 Abschlussbeh. Moon Privileg⁷ 2 Wochen Wartefrist Saphire⁶ 8 Tage Wartefrist	Apfelwickler ca. anfangs-mitte Juni Warndienst beachten	Zorro^{6,15,12} Audienz/Elvis^{15,12,22,26} Affirm/Rapid/Atac^{6,12,15,22,30} 2. Behandlung nach 14 Tagen 3. Behandlung nach 14 Tagen mit Zorro^{6,15,12} Granulosevirus MadexTop alle 8 Sonnentage 1x 100 ml dann 50 ml Verwirrung; Isomate- C Plus Mitte April ausbringen	Bei Zorro 2. Behandlung nach 4 Wochen mit Steward^{15,12,22} Affirm/Rapid/Atac^{6,12,15,22,30}, Zorro^{6,15,12} 12 Schalenwicklerwirkung 13 Flint, Tega, Corsil, Stroby gesamthaft zusammen max. 4 x pro Jahr 22 Kleiner Fruchtwickler-Wirkung 24 Nebenwirkung Kleiner Fruchtwickler 15 Bei Audienz/Spintor/Elvis/ Affirm/Rapid/Atac , wird die erste Behandl. ca. Anfangs-mitte Juni ausgeführt, und nach 14 – 16 Tagen wiederholt.
	Stüppe: Ab August 2 - 3 x bis 2 Wochen vor der Ernte Calziumchlorid +Netzmittel, Calshine, Seniphos	Frischer Naschfrass an den und/oder Schalenwickler	Früchten (1 %) vom Apfelwickler Anfangs August mit Audienz, Elvis, Spintor^{22,15,12,26} abgestopfen.	