


Merkblatt

## Neuansaat zur Wiesensanierung: Vorgehen

Sackgassbestände (Verunkrautungsstufe 3) können auf unterschiedliche Weise neu angesät werden. Auf ackerfähigem Land hat der vorgängige Anbau von ein bis zwei Ackerkulturen Priorität, da so am wenigsten Probleme mit der Rückverfestigung, Grasschübeln und Filz sowie Schnecken und Erdschnaken entstehen. Zudem werden so Samen unerwünschter Pflanzen dezimiert. Am besten äugstelt man die Kunstwiese nach Getreide oder sät sie bis am 20. September nach frühreifem Silomais. Ein ähnlicher Effekt hat das Einschalten eines Zwischenfutters, welches Futterengpässe vermeidet. Dieses wird am besten im August für die Dauer von einem Jahr angebaut. Bei sofortiger Neuansaat müssen die Kunstwiesen bis Ende August angesät werden, damit sie sich genügend entwickeln, im Herbst Blackenkeimlinge bekämpft und Säuberungsschnitte durchgeführt werden können.



☞ Liebegger Merkblätter „Wiesen erneuern, aber wie?“ „Problempflanzen des Grünlands“, „Entscheidungshilfe für die Mischungswahl“

☞ AGFF Merkblätter 4, 5, 7 ☞ Standardmischungen für den Futterbau (Agroscope), Samenkataloge des Saatguthandels