

## Pflaumenwickler

### Aktuelle Situation

Der Pflaumenwicklerflug war letzte und vorletzte Woche auf seinem tiefsten Niveau (siehe Tabelle 1). Ab diese Woche könnte der Flug wieder langsam zunehmen. Daraus kann man schliessen, dass der 1. Flug zu Ende geht und der 2. beginnt. Auch das Prognosemodell [SOPRA](#) sagt dies voraus (siehe Abbildung 1). Seit Jahren gibt es keine klare Trennung mehr zwischen dem 1. und 2. Flug: Die jetzt gefangenen Falter können sowohl die letzten des 1. als auch die ersten des 2. Fluges sein.

Je nach Regionen sollten also die ersten Pflaumenwickler-Faltern (2. Flug) diese Woche bis nächste Woche auftreten. Da es mindestens 9 Tage dauert, bis die Eier reif sind, könnten also die ersten Larven der 2. Generation nächste bis übernächste Woche schlüpfen.

Woche	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Summe
Endingen2	0	0	0	0	0	14	12	12	0	1	0	0	39
Herznach	0	8	0	3	1	27	13	1	1	9	2	4	69
Kaisten	3	9	1	6	21	38	20	18	18	21	11	9	175
Leuggern	0	0	0	5	12	45	24	7	5	6	2	4	110
Liebegg	0	0	0	1	8	10	9	4	4	2	0	1	39
Seengen	1	2	0	20	29	40	22	6	2	8	8	7	145
Wölflinswil	0	7	0	2	1	10	9	8	0	1	2	4	44
<b>Duchschnitt</b>	<b>0.6</b>	<b>3.7</b>	<b>0.1</b>	<b>5.3</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>4.3</b>	<b>6.9</b>	<b>3.6</b>	<b>4.1</b>	

Tabelle 1: Pflaumenwickler-Fänge (Falter-Flug) in Aargau bis am 23.06.2024

### SOPRA Prognose 26.06.24

### Pflaumenwickler, Grapholita funebrana

Klimaregion: Buchs-Aarau




Abbildung 1: Auszug aus dem Prognosemodell SOPRA "Pflaumenwickler" für die Region Buchs-Aarau am 26.06.2024. Achtung: hier wird von überwinterten Adulten und Adulte 1. Gen. gesprochen.

## Bekämpfung

Die Bekämpfung gegen die 2. Generation kann also in den frühen Regionen nächste Woche starten, und in den späteren Regionen, übernächste Woche. Für regionalen Details sehen Sie bitte der Prognosemodell [SOPRA](#).

Zugelassenen Bekämpfungsmittel 2024 (siehe [Allgemeinverfügung 2024 Pflaumenwickler](#)):

1. Affirm
  - Wartefrist: 21 Tage
  - Wirkungsdauer: ~ 10-12 Tage
  - Maximal 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr (Hoch- und Halbstammkulturen: Maximal 1 Behandlung)
2. Zorro
  - Wartefrist: 7 Tage
  - Wirkungsdauer: ~ 18-21 Tage
  - Maximal 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr

## Bekämpfungsstrategie Pflaumenwickler




Abbildung 2: Schematische Darstellung der Pflaumenwickler-Bekämpfung

Wir empfehlen, die Zwetschgen entsprechend ihren Reifeklasse zu behandeln.

Beispiel:




Abbildung 3: 1 letzte und 2 vorletzte Behandlungen gemäss Wartefrist und Wirkungsdauer platzieren

# Apfel-, Schalen- und Kleiner Fruchtwickler

Die **Apfelwickler**- und Kleiner Fruchtwickler-Flüge sind weiterhin im Gang (siehe Tabelle 2 und 3).

Der Flug des **Kleiner Fruchtwickers** hat sogar in ein paar Standorten letzte Woche zugenommen: Wo der Druck hoch ist, kontrollieren Sie, dass die Kulturen gegen diesen Schädling immer geschützt sind (Wirkungsdauer, Einsatzzeitpunkt des letzten Insektizides) und wiederholen Sie falls nötig die Behandlung.

**Schalenwickler** werden weiterhin kaum gefangen. Theoretisch ist der 1. Flug jetzt fertig und der 2. Flug sollte in den nächsten Wochen im Gang kommen (siehe [SOPRA](#)). Jetzt sind aber die Raupen der 1. Generation gut zu sehen.

## Weitere Infos und Bekämpfung

⇒ Siehe [Obstbau aktuell n°15](#) und [Obstbau aktuell n°17](#)

Woche	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Summe
Küttingen		0	0	16	4	3	0	3	1	7	34
Leuggern	0	0	0	6	16	7	8	6	4	5	52
Liebegg	0	2	7	23	22	2	7	20	14	12	109
Wölflinswil	0	0	2	2	2	1	1	0	1	0	9
<b>Duchschnitt</b>	<b>0</b>	<b>0.5</b>	<b>2.3</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>3.3</b>	<b>4</b>	<b>7.3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	

Tabelle 2: Apfelwickler-Fänge in Aargau bis am 23.06.2024

Woche	19	20	21	22	23	24	25	Summe
Küttingen	0	2	1	0	1	5	1	10
Leuggern	0	0	0	0	0	4	0	4
Liebegg	0	2	1	1	9	3	5	21
Muri	0	2	0	6	18	20	21	67
Seengen	0	0	0	0	1	0	2	3
<b>Duchschnitt</b>	<b>0</b>	<b>1.2</b>	<b>0.4</b>	<b>1.4</b>	<b>5.8</b>	<b>6.4</b>	<b>5.8</b>	

Tabelle 3: Kleiner Fruchtwickler-Fänge in Aargau bis am 23.06.2024

# Birnblattsauger

Trotz der anhaltenden Regenfälle zeigen einige Parzellen einen starken Druck des Birnblattsaugers. Alle Entwicklungsstadien sind derzeit sichtbar. Die Parzellen sollten regelmässig auf das Vorhandensein von Junglarven kontrolliert und gegebenenfalls mit Blockbehandlungen (2-3 Behandlungen à 4-5 Tage Abstand) mit Schmierseife, Kaliumbicarbonat oder Orangenöl (Prev AM) bekämpft werden.

## Weitere Infos und Bekämpfung

⇒ Siehe [Obstbau aktuell n°14](#) und [Faktenblatt Birnblattsauger](#)

# Kirschessigfliege (Kef) und Kirschfruchtfliege (Kif)

Relevanten Fängen aus dem Kanton Aargau:

Woche	20	21	22	23	24	25	Summe
Herznach	0	0	2	10	43	61	116
Kaisten	3	3	2	2	1	1	12
Künten	0	1	0	0	0	0	1
Leuggern	0	2	0	0	0	0	2
<b>Duchschnitt</b>	<b>0.8</b>	<b>1.5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	

*Tabelle 4: Kirschenfliegen-Fänge in Aargau bis am 23.06.2024*

Woche	22	23	24	25	Summe
Kaisten	0	1	2	4	7
Leuggern	0	0	0	0	0
Liebegg	0	0	1	0	1
Olsberg	0	0	2	10	12
<b>Duchschnitt</b>	<b>0</b>	<b>0.3</b>	<b>1.3</b>	<b>3.5</b>	

*Tabelle 5: Kef-Fänge in Aargau bis am 23.06.2024*

## Weitere Infos und Bekämpfung

⇒ Siehe [Obstbau aktuell n°15](#) und [Obstbau aktuell n°17](#)

## Feuerbrand

In der Deutschschweiz werden immer mehr Feuerbrand-Befallstellen gemeldet. Bitte kontrollieren Sie Ihren Anlagen auf Feuerbrand-Befall und melden Sie uns allfälligen Symptomen.