

## FOLGERUNGEN AUS DER LETZJÄHRIGEN ERNTEKONTROLLE

SCHÄDLINGE	FRUCHT-BEFALL	URSACHE	FOLGERUNG FÜR DAS KOMMENDE JAHR
<b>APFELWICKLER (OBSTMADE)</b>	< 1 %	gute Bekämpfung  geringer Befall	Behandlungen mit Larviziden und anschliessend Häutungsbeschleunigern ist ausreichend. Wirkungsdauer der versch. Larviziden beachten. geringer Befallsdruck
	> 3 %	ungenügende Bekämpfung  vorwiegend alte Befallsstellen vorwiegend junge Befallsstellen	starker Befallsdruck, Behandlungszeitpunkt und -intervall prüfen Behandlungszeitpunkt vorziehen Wiederholung der Behandlung einplanen, Flugkontrolle
<b>KLEINER FRUCHTWICKLER</b>	< 1 %	gute Bekämpfung geringer Befall	Keine besonderen Massnahmen geringer Befallsdruck
	> 5 %	Bekämpfung ungenügend (falsche Mittelwahl oder falscher Zeitpunkt) starker Befall	2 Behandlung, Ende Mai/Anfangs Juni mit Steward, Affirm, Rapid 2 Behandlung, Ende Mai/Anfangs Juni mit Steward, Affirm, Rapid
<b>SCHALENWICKLER</b>	< 0.5 %	geringer Befall gute Bekämpfung	geringer Befallsdruck regelmässige Kontrolle
	> 1 %	starker Befall  ungenügende Bekämpfung	Behandlung mit Capex, Steward oder Prodigy vorsehen, regelmässige Kontrolle Behandlung mit Capex, Steward oder Prodigy vorsehen, regelmässige Kontrolle
<b>BODENSEEWICKLER</b>	< 1 %	geringer Befall gute Bekämpfung	keine Behandlung notwendig keine Behandlung notwendig
	> 3 %	starker Befall	Nachblütenbehandlung nach Rücksprache mit der Beratung
<b>SÄGEWESPEN</b> (auch Nachblütenkontrolle berücksichtigen !)	< 0.5 %	geringer Befall  gute Bekämpfung	Keine Behandlung erforderlich (weisse Kreuzfallen während der Blüte montieren) Kontrolle beim Abblühen (weisse Kreuzfallen während der Blüte montieren)
	> 1 %	starker Befall ungenügende Bekämpfung	Weisse Kreuzfallen während der Blüte montieren Behandlungszeitpunkt eventuell vorziehen