

**Bewilligte Pflanzenschutzmittel gegen D. suzukii für die Saison 2019 (Gemäss Allgemeinverfügung BLW 18.02.2019)**

Mittelname	Wirkstoff	Bio-Anbau	Kirschen Wartefrist	Zwetschgen Wartefrist	Wirkungsdauer gegen Fliegen (verschiedene Literaturquellen)	Wirkungsdauer gegen Larven (verschiedene Literaturquellen)	Kosten je Behandlung pro ha	Auflagen: Einsatz <b>bei Fängen in den Kontrollfallen</b> oder <b>bei Schäden auf den Früchten in der Parzelle oder in der Nähe</b> . Die Wirksamkeit der Mittel ist nicht garantiert, da nicht in der Praxis geprüft.
<b>Alanto</b> 0.025% (0.4 L/ha)	Thiacloprid	Nein	<b>14 Tage</b>	<b>14 Tage</b>	<b>3 - 4 Tage</b>	<b>5 - 6 Tage</b>	<b>Fr. 114.-</b>	Es sind maximal 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr mit Produkten aus der selben Wirkstoffgruppe der Neonicotinoide (Alanto, Gazelle, Oryx Pro erlaubt).
<b>Gazelle, Oryx Pro</b> 0.02 % (0.32 ha)	Acetamiprid	Nein	<b>7 Tage</b>	<b>14 Tage</b>	<b>3 - 4 Tage</b>	<b>5 - 6 Tage</b>	<b>Fr. 113.-</b>	Es sind maximal 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr mit Produkten aus der selben Wirkstoffgruppe der Neonicotinoide (Alanto, Gazelle, Oryx Pro) erlaubt.
<b>Audienz, Spintor</b> 0.02% (0.32 L/ha)	Spinosad <b>(Bienengift!)</b>	Ja	<b>7 Tage</b>	<b>7 Tage</b>	<b>5 – 6 Tage</b>	<b>6 – 7 Tage</b>	<b>Fr. 190.-</b>	max. 2 x pro Parzelle/ Jahr
<b>Parexan N, Sepal</b> 0.1 %, (1.6 L/ha) <b>Pyrethrum FS</b> 0.05% (0.8 L/ha)	Pyrethrin, Sesamöl <b>(Bienengift!)</b>	Ja	<b>3 Tage</b>	<b>3 Tage</b>	<b>1 – 2 Tage</b>	<b>1 – 2 Tage</b>	<b>Fr. 312.-</b> <b>Fr. 335.-</b>	max. 3 x pro Parzelle/Jahr
<b>Surround</b> 2% (32 Kg/ha)	Kaolin	ja	<b>keine</b>	<b>keine</b>			<b>Fr. 127.-</b>	Belag nach 20 mm abgewaschen Nur für Brennkirschen
<b>Nekagard 2</b> 0.18-0.2% (1.8 - 2.0 Kg/ha) 0.2-0.5% (2.0 - 5.0 Kg/ha)	Kalk	ja ja	<b>2 Tage</b> <b>2 Tage</b>	<b>2 Tage</b> <b>2 Tage</b>			<b>ca. Fr. 5.-</b> <b>ca. Fr. 10.-</b>	Tafelkirschen Nur zur Produktion von Brenn- und Industrieobst

Da diese Insektizide vor allem gegen Adulte KEF wirken, ist die Wirksamkeit höher, wenn diese **Morgens oder Abends mit höherer Wasseraufwandmenge( v.a. Parexan N, Pyrethrum FS, Sepal) ausgebracht werden**, wenn die KEF aktiv ist.