


Einsatzzeitpunkte von Schorf- u. Mehлтаumitteln im Apfelanbau 2020 Stand : 20.02.2020



- 1) Produkte mit nur vorbeugenden Schutz. Nach Niederschlägen über 30 mm Schutz erneuern.
 - 2) Anilino-Pyrimidine haben auch bei tieferen Temperaturen gute Wirkung, mit Wirkung gegen Monilia.
 - 3) Bei Blütenbehandlungen Wirkung auf Kelchfäule.
 - 4) Captan max. 10 Anwendungen pro Jahr.
 - 5) Ab Rotknospenstadium bis Junifall einsetzen.
 - 6) Flint, Tega haben wie Stroby gute Dauerwirkung und hohe Regenbeständigkeit. Aus der Gruppe der Strobilurine (Stroby/Flint/ Tega) sind max. 4 Beh. pro Jahr zugelassen.
- Achtung: Wirkstoffgruppen abwechseln! nach 2 Beh. aus der gleichen Wirkstoffgruppe sind die nächsten zwei Beh. aus einer anderen Wirkstoffgruppe durchzuführen!*
- 7) Bei Strobilurinen Pflanzenverträglichkeit + Mischbarkeit beachten!
 - 8) Moon Experience zählt als SSH – Beh.
 - 9) Bellis zählt als Strobilurin.
 - 10) In Kombination mit Captan/Delan volle Wirkung gegen Schorf.
 - 11) Pro Parzelle & Jahr darf nach der Blüte insgesamt nicht mehr als 3400 g des Wirkstoffs Dithianon (Delan u.a.) pro ha anwenden werden. Entspricht 6 Behandlungen mit 0.05 % bzw. 0.8 kg/ha bzw. in Tankmischung mit 0.03 % (0.480 kg/ha) 10 Behandlungen.
 - 12) Flint, Tega nicht mischen mit Netzmittel, EC-Mittel!