


# Einsatzzeitpunkte von Schorf- u. Mehлтаumitteln im Apfelanbau 2019 Stand : 14.02.2019



- 1) Produkte mit nur vorbeugenden Schutz. Nach Niederschlägen über 30 mm Schutz erneuern.
- 2) Anilino-Pyrimidine haben auch bei tieferen Temperaturen gute Wirkung, mit Wirkung gegen Monilia.
- 3) Bei Blütenbehandlungen Wirkung auf Kelchfäule.
- 4) Captan max. 10 Anwendungen pro Jahr.
- 5) Ab Rotknospenstadium bis Junifall einsetzen.
- 6) Flint, Tega haben wie Stroby gute Dauerwirkung und hohe Regenbeständigkeit. Aus der Gruppe der Strobilurine (Stroby/Flint/ Tega) sind max. 4 Beh. pro Jahr zugelassen. *Achtung: Wirkstoffgruppen abwechseln! nach 2 Beh. aus der gleichen Wirkstoffgruppe sind die nächsten zwei Beh. aus einer anderen Wirkstoffgruppe durchzuführen!*
- 7) Bei Strobilurinen Pflanzenverträglichkeit + Mischbarkeit beachten! 8) Moon Experience zählt als SSH – Beh. 9) Bellis zählt als Strobilurin. 10) In Kombination mit Captan/Delan volle Wirkung gegen Schorf. 11) Pro Parzelle und Jahr darf man nach der Blüte insgesamt nicht mehr als 3400 g des Wirkstoffs Dithianon (Delan, Atollan, Legan u.a.) pro ha anwenden. 12) Flint, Tega nicht mischen mit Netzmittel, EC-Mittel!