

FOLGERUNGEN AUS DER LETZJÄHRIGEN ERNTEKONTROLLE

| SCHÄDLINGE | FRUCHT-BEFALL | URSACHE | FOLGERUNG FÜR DAS KOMMENDE JAHR |
|---|---------------|---|--|
| APFELWICKLER (OBSTMADE) | < 1 % | gute Bekämpfung geringer Befall | Behandlungen mit Larviziden und anschliessend Häutungsbeschleunigern ist ausreichend. Wirkungsdauer der versch. Larviziden beachten. geringer Befallsdruck |
| | > 3 % | ungenügende Bekämpfung vorwiegend alte Befallsstellen vorwiegend junge Befallsstellen | starker Befallsdruck, Behandlungszeitpunkt und -intervall prüfen Behandlungszeitpunkt vorziehen Wiederholung der Behandlung einplanen, Flugkontrolle |
| KLEINER FRUCHTWICKLER | < 1 % | gute Bekämpfung geringer Befall | Keine besonderen Massnahmen geringer Befallsdruck |
| | > 5 % | Bekämpfung ungenügend (falsche Mittelwahl oder falscher Zeitpunkt) starker Befall | 2 Behandlung, Ende Mai/Anfangs Juni mit Steward, Affirm, Rapid 2 Behandlung, Ende Mai/Anfangs Juni mit Steward, Affirm, Rapid |
| SCHALENWICKLER | < 0.5 % | geringer Befall gute Bekämpfung | geringer Befallsdruck regelmässige Kontrolle |
| | > 1 % | starker Befall ungenügende Bekämpfung | Behandlung mit Capex, Mimic, Steward oder Prodigy vorsehen, regelmässige Kontrolle Behandlung mit Capex, Mimic, Steward oder Prodigy vorsehen, regelmässige Kontrolle |
| BODENSEEWICKLER | < 1 % | geringer Befall gute Bekämpfung | keine Behandlung notwendig keine Behandlung notwendig |
| | > 3 % | starker Befall | Nachblütenbehandlung nach Rücksprache mit der Beratung |
| SÄGEWESPEN (auch Nachblütenkontrolle berücksichtigen !) | < 0.5 % | geringer Befall gute Bekämpfung | Keine Behandlung erforderlich (weisse Kreuzfallen während der Blüte montieren) Kontrolle beim Abblühen (weisse Kreuzfallen während der Blüte montieren) |
| | > 1 % | starker Befall ungenügende Bekämpfung | Weisse Kreuzfallen während der Blüte montieren Behandlungszeitpunkt eventuell vorziehen |