







# MONILIA- UND SCHROTSCHUSSSTRATEGIE BEI KIRSCHEN 2019

Stand: 25.01.2019

B  52	E  59	F  65	G  67	I  72	J  73	Farbumschlag	Fruchtausreife
Delan Kupfer	Thiophanat-Methyl (Sicherheitsabstand 50 m zu Oberflächengewässer) <b>Cercobin (**)</b> Blüten- Zweigmonilia Maximal 2 Behandlungen						
	Dicarboximide <b>Baldo (**)</b> Blüten- und Zweigdürre(Monilia) und Fruchtmonilia Maximal 2 Behandlungen						
Maximal 3 Behandlungen bei Solo-Anwendung oder max. 5 Anwendungen bei reduzierter Aufwandmenge in Tankmischung wie z. B. mit SSH -Fungizide							
Delan WG, Legan WG, Atollan, Rucolan Schrotschuss, Sprühfleckenkrankheit, Bitterfäule, Kirschenschorf, Gnomonia Stad. D							
Phtalimide: <b>Captan<sup>5)</sup></b> , <b>Malvin<sup>5)</sup> WG</b> , <b>Folpet</b> Schrotschuss, Sprühfleckenkrankheit, Bitterfäule, Kirschenschorf							
SSH Sterolsyntesehemmer <b>Slick, Sico, Divo, Difcor, Bogard</b> , nur in Tankmischung mit Captan od. Delan (Dithianon) Blüten- und Zweigdürre, Fruchtmonilia, Bitterfäule, Schrotschuss Maximal 4 Behandlungen							Wartefrist 3 Wochen
Duotop Plus, Systhane C WG Blüten- und Zweigdürre (Monilia), Schrotschuss, Bitterfäule, Systhane C zusätzlich auch gegen Gnomonia <b>bis Schornigelstadium</b> Maximal 4 Behandlungen							
SSH Sterolsyntesehemmer <b>bis Schornigelstadium</b> (**) <b> Fezan + Delan</b> Blüten- Schornigelmonilia, Schrotschuss, Bitterfäule Maximal 3 Behandlungen							
Strobilurine (*) <b>nur bis Ende Blüte</b> <b>Amistar, Ortiva, Legado, Globazar</b> Blüten- und Zweigdürre (Monilia), Schrotschuss, Sprühfleckenkrankheit Maximal 3 Behandlungen							
Strobilurine (*) <b>Flint, Tega, Tega Plus</b> Blüten- und Zweigdürre (Monilia), Schrotschuss, Sprühfleckenkrankheit, Fruchtmonilia, Bitterfäule, Flint, Tega, zusätzlich auch gegen Gnomonia. Tega Plus nur Monilia und Schrotschuss bei Kirschen Maximal 3 Behandlungen							Wartefrist 3 Wochen
Hydroxyanilide & Pyrazolinone <b>Teldor<sup>2)</sup> + Delan, Prolectus<sup>1)</sup> + Delan</b> Blüten- und Zweigdürre (Monilia), Bäume mit Abdeckung Fruchtmonilia, Bitterfäule <sup>2)</sup> Maximal 2 bzw. <sup>1)</sup> Maximal 3 Behandlungen							
Fluopyram <b>Moon Privilege 0.025 %</b> Fruchtmonilia Maximal 2 Behandlungen							Wartefrist 14 Tage
Fluopyram SDHI <b>Moon Privilege 0.0175 %+ Flint 0.0175 %, Moon Sensation 0.035 %</b> , Fruchtmonilia, Schrotschuss, Bitterfäule Maximal 3 Behandlungen (zählt als Strobilurinbehandlung)							
Hydroxyanilide & Pyrazolinone <b>Teldor<sup>2)</sup>, Prolectus<sup>1)</sup></b> Blüten- und Zweigdürre (Monilia), Fruchtmonilia Bäume ohne Abdeckung <sup>2)</sup> Maximal 2 bzw. <sup>1)</sup> Maximal 3 Behandlungen							Wartefrist 10 Tage

(\*) Achtung: **Stroby WG** ist auf Kirschen nicht zugelassen, da es bei diversen Sorten Unverträglichkeiten gibt, es können Blattschäden auftreten, **Amistar nicht** bei Kernobst verwenden!

(\*\*) Die Tankmischung mit **Delan** oder **Captan** bringt Schrotschusswirkung, ist nur eine Empfehlung, ist aber in der Bewilligung nicht festgelegt.

5) **Captan** max. 10 Anwendungen pro Parzelle und Jahr.