








Tafeläpfel 2020

Stadium	Schorf/Mehltau	Schädlinge	Mittel	Bemerkungen
 B = 52 - C = 53	Ab Stadium B - C Evtl. 1 Behandlung mit Kupfer , dann 1-2 mal mit Delan¹⁴ oder Captan³⁰ anschliessend Dodine⁶ ,	Beim Knospenaufbruch Apfelblütenstecher	Reldan 22²⁸ 0.2% Alanto^{6, 17, 33} 0.02% Gazelle, Oryx Pro^{6, 17, 33} 0.02% Audienz/Spintor 0.02 %	Grosse Obstbaum- und Austernschildlaus mit Paraffinöl 3.5 % beh. Max. 1,5 Kg Kupfer pro Jahr Holzbohrerfallen aufhängen 8 Stk. je ha, Alkohol alle 2 Tage wechseln
 D = 55	Espiro^{1, 23}, Papyrus^{1, 23}, Pyrus^{1, 23}, Chorus^{1, 23}, Frupica^{1, 23} oder Faban¹, Espiro Plus¹, Venturex¹ + jeweils Mehltaumittel zusetzen. Bis zum Abblühen. Max. 3 Behandlungen Nach Warndienst !	Rote Spinne gegen Wintereier Blattläuse	Apollo SC² 0.04% Credo² / Nissostar² Pirimor³ 0.04% Alanto^{3, 6, 17, 25, 33} 0.02% Gazelle^{3, 6, 17, 33} 0.15% ¹⁸ Neem Azal^{4, 35} 0.3% ⁴ Tepeki⁶ 0.01 %	¹ Kelchfäulewirkung ² max. 1 x pro Saison ³ max. 1 Behandl. pro Jahr auf dieselbe Art ⁴ keine Graslauswirkung, Oikos ähnlich wie Neem Azal³⁵ ²⁵ Frostspannerwirkung ¹⁸ Gazelle bis Ende Juni 0.15 % ab Juli 0.01 %
 E2 = 59 Vor der Blüte	oder bereits ab Stadium E bis 31. Juli Stroby WG^{13, 23} oder Flint^{13, 23}, Tega^{13, 23} (Zusammen gesamthäft 4 Beh./Jahr) Nach Warndienst !	Frostspanner Vor dem Aufblühen	Mimic⁵ / Steward⁵ Prodigy⁵ / Audienz/Spintor / Zorro^{5, 6} / Affirm/Rapid^{5, 6, 32}	²⁸ Reldan 22 mit Blattlausteilwirkung ⁵ Frostspanner- Eulen und Schalenwicklerwirkung ³³ Max. 2 Beh. pro Parzelle und Jahr mit Produkten aus der selben Wirkstoffgruppe Sägewespenfallen aufhängen
 F2 = 65 Blüte	Ab Blüte SSH-Mittel²³, StrobyWG^{13, 23}, Flint, Tega^{13, 23}, Bellis^{7, 23}, Sercadis^{7, 23}, Rondo Sky^{7, 23}, Fontelis^{2, 23}, Furioso^{2, 23} Bis 31. Juli Gegen Berostungen ab Blüte max. 5 x 4 - 5 kg/ha Netzschwefel¹⁰ zusetzen.			Gegen Kelchfäule : in die Blüte Chorus, Cercobin⁶, Espiro, Frupica Faban oder Derosal⁶ (Carbendazim). ⁶ max. 2 Behandl. pro Saison ⁷ max. 3 Behandl. pro Saison ³⁴ gegen Schorf max. 6 x pro Jahr ³⁰ Maximal 10 Anwendungen pro Jahr.
 G = 67 Abblühen	Stamina S^{34, 23} (max. 6 x) Delan Pro³⁴ (max. 6 x) Phoscap³⁰ Curatio (Schwefelkalk) wird kurativ aufs nasse Laub ausgebracht.	Sofort beim Abblühen Sägewespe	Reldan 22²⁸ 0,2% Quassan / Quassin 0,2% Alanto^{3, 6, 17, 33, 35} 0,02% Gazelle, Oryx Pro^{6, 17, 33} 0,02%	²³ in Tankmischung mit Captan³⁰ oder Delan¹⁴ ¹⁷ Blattlauswirkung ³¹ Wirkung auf Austern- & Kommaschildlaus beim Schlupfbeginn Ende Mai/Anfang Juni.
 I = 71	Ab Junifall Captan³⁰, Folpet¹¹ plus Mehltaumittel Nimrod, Topas Vino²⁷ Topas²⁷, Bellis⁷, Moon Experience⁷, Moon Privileg⁷, Cyflamid⁶ + Netzmittel Nach Hagelschlag sofort : Captan³⁰/Malvin³⁰ oder Flint/Tega + Malvin ausbringen und Abschlussbehandlungen weiterführen.	Blattläuse Rote Spinne	Pirimor^{3, 9} ab Juli 0,02 % Alanto^{3, 6, 17, 6, 1, 33, 35} 0,02% Gazelle^{3, 6, 17, 33} 0,015% ¹⁸ Tepeki⁶ 0,01 % Movento SC^{6, 31} 0,09 % - 0,125%	⁹ Teilwirkung Kommaschildlaus ³⁵ Wirkt gegen Miniermotten ¹⁴ Pro Parzelle und Jahr nach der Blüte insgesamt nicht mehr als 3400 g des Wirkstoffs Dithianon (Delan, Atollan, Legan u.a.) pro ha anwenden! ¹⁰ Rostmilbenwirkung ¹⁹ Teilwirkung auf Rostmilben ²⁰ gegen mobile Stadien ²¹ gegen Larven u. Nymphen
 J = 73	In Feuerbrandgebieten sofortige Behandlung mit max. 2 kg Kupfer 50 % (Berostungsgefahr). In Parzellen mit geringeren Schäden (Tafelobst noch möglich) max. 0.3 kg Kupfer 50 % behandeln. Bis 31. Juli	Blutläuse Kl. Frucht-/Apfelwickler Ende Mai/Anfangs Juni Warndienst beachten	Pirimor 0,04 % bei Temp. über 22°C. Netzmittel zusetzen, (2 Beh. im Abstand von 10-14 Tagen) Movento SC⁶ 0.125 % Steward^{15, 12, 22} 0,017% Affirm/Rapid^{12, 15, 22, 32} 0,0,2% Prodigy^{12, 22b} 0,04%	¹¹ Folpet nicht bei Birnen ! ²⁷ max. 4 Behandlung pro Jahr ³² nur in Obstanlagen
	Abschlussbehandlung 2 - 3 Behandlungen im August bis 3 Wochen vor der Ernte, Captan³⁰, Folpet, Bellis^{6, 13} <small>Netzmittel zusetzen.</small> Flint¹³, Tega¹³ ohne Netzmittel! Flint¹³, Tega¹³, Bellis⁶ nur in Mischung mit Captan³⁰ oder Folpet <small>max. 1 Abschlussbehandlung.</small> Moon Experience⁷ <small>(zählt als SSH-Beh.)</small> Bellis⁶ <small>(zählt als Strobiturin) max. 2 Abschlussbeh.</small> Moon Privilege⁷ <small>2 Wochen Wartefrist</small> Saphire⁶ <small>8 Tage Wartefrist</small>	Apfelwickler ca. anfangs-mitte Juni Warndienst beachten	Mimic^{2, 12}, Prodigy^{12, 22b, 22}, Zorro^{6, 15, 12} ¹⁵ Steward^{15, 12, 22}, Audienz^{15, 12, 22} Affirm/Rapid^{6, 12, 15, 22, 32} 2. Behandlung nach 14 Tagen 3. Behandlung nach 14 Tagen mit Mimic^{2, 12}, Prodigy^{12, 22b}, Zorro^{6, 15, 12} Isomate- C Plus-Verwirrung RAK 3 - Verwirrung²⁶	Bei Prodigy, Mimic, Zorro 2. Behandlung nach 4 Wochen mit Steward^{15, 12, 22}, Affirm^{6, 12, 15, 22, 32}, Zorro^{6, 15, 12} ¹² Schalenwicklerwirkung ¹³ Flint, Tega, Tega Plus, Stroby gesamthäft zusammen max. 4 x pro Jahr ²² Kleiner Fruchtwickler-Wirkung ^{22b} Nebenwirkung Kleiner Fruchtwickler ¹⁵ Bei Steward/Audienz/Spintor/Affirm/Rapid , wird die erste Behandl. ca. Anfangs-mitte Juni ausgeführt, und nach 14 - 16 Tagen wiederholt.
	Stippe : Ab August 2 - 3 x bis 2 Wochen vor der Ernte Calziumchlorid + Netzmittel oder Calshine oder Seniphos	Frischer Naschfrass an den und/oder Schalenwickler Steward^{15, 12, 22} werden.	Früchten (1 %) vom Apfelwickler kann Anfangs August mit Audienz, Spintor^{22, 15, 12} abgestopt	

