










Empfohlene Pflanzenschutzmittel im Verarbeitungsgemüse für die Saison 2019

Spinatanbau

In Zusammenarbeit der SCFA (Swiss Convenience Food Association) und des VSGP (Verband Schweizer Gemüseproduzenten)

Problem	 Saat	 Keimblatt	 2 - 4 Blatt	 Erntereif	Bemerkungen			
Unkräuter im Voraufbau	Cargon S 0.15 (Clomazone) + Venzar 0.5 - 0.6 (Lenacil)				Nicht in Sandböden einsetzen! Cargon S nicht überdosieren Gefahr von Blattaufhellungen! (Chlorose) Je nach Bodenart und Jahr könnten bei Venzar > 0.5 kg /ha Nachbauprobleme auftreten.			
	Venzar, Spark Venzar SC Lenacil 1.0 - 1.5 (Lenacil)							Wegen Nachbauprobleme nur im Winterspinat einsetzen.
	Goltix 700 SC 2.0 (Metamitron)							Es sind die vom Bewilligungsinhaber festgelegten Vorsorgemassnahmen einzuhalten.
	Oblix 200 EC 2.0 (Ethofumesat)							Keine Anwendungen im Herbst und Winter. Gefahr von Kulturschäden bei Anwendungen auf leichten Böden
Unkräuter im Nachaufbau		Phenmedipham-Produkte 0.8 - 3.0 (Phenmedipham)			Behandlung im Splitverfahren: 2 x 0.8 – 1.5 im Abstand von 4 - 5 Tagen. 1. Behandlung im frühen Keimblattstadium der Unkräuter, Beginn Zwei-Blattstadium des Spinates. Im Winterspinat einmalig 3.0 l/ha. Nur am Abend spritzen. Wartefrist: 3 Wochen			
Gräser, Hirsen, Ausfallgetreide			Agil, Propaq 0.75-1.0 (Propaquizafop) Gallant 535 0.3 - 0.4 (Haloxifop-methylester) Fusilade Max 1.5 (Fluazifop-butyl) Focus Ultra 1.0 - 2.0 (Cycloxydim)			Keine Queckenbekämpfung. Wartefristen: Agil Focus Ultra 3 Wochen andere 4 Wochen		

Rückseite beachten

Problem	 Saat	 Keimblatt	 2 - 4 Blatt	 Erntereif	Bemerkungen
Erdraupen			Audienz 0.2 – 0.4 (Spinosad) Karate Zeon, Techno 10 CS 0.1 (Lambda-Cyhalothrin)		Wartefristen: 1 Woche
Blattläuse			Pirimor 0.3 - 0.5 (Pirimicarb)		Wartefrist: 2 Wochen
Schnecken	Metaldehyd-Schneckenkörner				Nur befallene Stellen behandeln Auf den Boden zu streuen. Keine essbaren Pflanzenteile bestreuen.
Mehltau			Ridomil Gold 2.5 (Metalaxyl-M + Mancozeb)		Behandlung im 4 bis Beginn 6 Blattstadium Wartefrist 2 Wochen Winterspinat 3 Wochen
			Previcur Energy 1.5 – 2.5 (Propamocarb-Fosetylal)		Wartefrist: 2 Wochen
			Revus 0.6 (Mandipropamid)		Wartefrist: 7 Tage Maximal 2 Behandlungen pro Kultur im Abstand von 7 Tagen
			Bion 40 - 60 g (Acibenzolar-S-methyl)		1. Behandlung im 4 bis Beginn 6 Blattstadium . 2. Behandlung 7 bis 10 Tage später Wartefrist: 1 Woche
Mehltau Papierflecken					