









# Empfohlene Pflanzenschutzmittel im Verarbeitungsgemüse für die Saison 2021

## Spinatanbau

In Zusammenarbeit der SCFA (Swiss Convenience Food Association) und des VSGP (Verband Schweizer Gemüseproduzenten)

Problem	 Saat	 Keimblatt	 2 – 4 Blatt	 Erntereif	Bemerkungen
Unkräuter im Voraufbau	Cargon S 0.15 (Clomazone) + Venzar 0.5 - 0.6 (Lenacil)				Nicht in Sandböden einsetzen! Cargon S nicht überdosieren Gefahr von Blattaufhellungen! (Chlorose) Je nach Bodenart und Jahr könnten bei Venzar > 0.5 kg /ha Nachbauprobleme auftreten.
	Spark Venzar, Lenacil 1.0 - 1.5 (Lenacil)				Wegen Nachbauprobleme nur im Winterspinat einsetzen.
	Beta Omya, Goltix 700 SC 2.0 (Metamitron)				Es sind die vom Bewilligungsinhaber festgelegten Vorsorgemassnahmen einzuhalten.
	Oblix 200 EC 2.0 (Ethofumesat)				Keine Anwendungen im Herbst und Winter. Gefahr von Kulturschäden bei Anwendungen auf leichten Böden.
Unkräuter im Nachaufbau			Phenmedipham-Produkte 0.8 - 3.0 (Phenmedipham)	Behandlung im Splitverfahren: 2 x 0.8 – 1.5 im Abstand von 4 - 5 Tagen. 1. Behandlung im frühen Keimblattstadium der Unkräuter, Beginn Zwei-Blattstadium des Spinates. Im Winterspinat einmalig 3.0 l/ha. Nur am Abend spritzen. <b>Wartefrist: 3 Wochen</b>	

Rückseite beachten

<b>Problem</b>	 Saat	 Keimblatt	 2 - 4 Blatt	 Erntereif	<b>Bemerkungen</b>
<b>Gräser, Hirsen, Ausfallgetreide</b>			Agil, Propaq 0.75-1.0 (Propaquizafop) Gallant 535 0.3-0.4 (Haloxyp-methylester) Fusilade Max 1.5 (Fluazifop-butyl) Focus Ultra 1.0 - 2.0 (Cycloxydim)		Keine Queckenbekämpfung. <b>Wartefristen: Agil Focus Ultra 3 Wochen andere 4 Wochen</b>
<b>Erdraupen</b>			Audienz 0.2 – 0.4 (Spinosad) Karate Zeon, Techno 10 CS 0.1 Tak 50 0.2 (Lambda-Cyhalothrin) Dipel DF 0.6 (Bacillus thuringiensis var.kurstaki)		<b>Wartefristen: 1 Woche</b>  <b>Wartefrist: 3 Tage</b>
<b>Blattläuse</b>			Pirimor, Pirimicarb 0.3 - 0.5 (Pirimicarb)		<b>Wartefrist: 2 Wochen</b>
<b>Schnecken</b>	Metaldehyd-Schneckenkörner				Nur befallene Stellen behandeln Auf den Boden zu streuen. Keine essbaren Pflanzenteile bestreuen.
<b>Mehltau</b>			Ridomil Gold 2.5 (Metalaxyl-M + Mancozeb)		Behandlung im 4 bis Beginn 6 Blattstadium <b>Wartefrist 2 Wochen Winterspinat 3 Wochen</b>
			Previcur Energy 1.5 – 2.5 (Propamocarb-Fosetylal)		<b>Wartefrist: 2 Wochen</b>
			Revus 0.6 (Mandipropamid)		<b>Wartefrist: 7 Tage</b> Maximal 2 Behandlungen pro Kultur im Abstand von 7 Tagen
<b>Mehltau Papierflecken</b>			Bion 40 - 60 g (Acibenzolar-S-methyl)		1. Behandlung im 4 bis Beginn 6 Blattstadium . 2. Behandlung 7 bis 10 Tage später <b>Wartefrist: 1 Woche</b>