











Empfohlene Pflanzenschutzmittel im Verarbeitungsgemüse für die Saison 2018

Drescherbsenanbau

In Zusammenarbeit der SCFA (Swiss Convenience Food Association) und des VSGP (Verband Schweizer Gemüseproduzenten)

Problem	 Blatt- bildung	 Ranken- bildung	 Blattentwicklung Längenwachstum	 Entwicklung Blütenanlagen	 Blüte	Bemerkungen	
Einjährige Unkräuter und Gräser	Bandur 1.0 + Basagran, Bagri, Bentazon, 1.0 oder Basagran SG 0.6 - 1.0 (Aclonifen+ Bentazon)					Bei heissen Temperaturen und starkem Licht- einfluss sollte die Aufwandmenge von Bandur wegen Verbrennungsgefahr auf 0.8 l gesenkt werden.	
	Stomp SC, Stomp Aqua, Sitradol-SC; Hysan; + Basagran, Bentazonprodukte 1.0 - 2.0 oder Basagran SG 0.6 - 1.0 (Pendimethalin+ Bentazon)						
		Bolero 0.8 (Imazamox)					Die Dosierung von 0.8 l/ha sollte nicht überschritten werden. Grund: Unkontrollierte Abreife
		Bolero 0.8 -1.0 + Basagran, Bentazonprodukte 1.0 – 2.0 oder Basagran SG 0.6 – 1.0 (Imazamox+ Bentazon)					
Einjährige Unkräuter besonders Kamillen, Melden, Sonnenblu- men, Blacken, Disteln, Klebern, Winden			MCPB, Divopan, Trifolin 4.0 + Basagran, Bentazonprodukte 1.0 – 2.0 oder Basagran SG 0.6 – 1.0 (MCPB + Bentazon)			Immer ganze Parzellen behandeln.	
			MCPB, Divopan, Trifolin 4.0 (MCPB)				

Rückseite beachten

Problem	 Blatt- bildung	 Ranken- bildung	 Blattentwicklung Längenwachstum	 Entwicklung Blütenanlagen	 Blüte	Bemerkungen
Gräser Hirsen			Agil 0.75 - 1.0 (Propaquizafop) Targa Super 0.75-1.25 (Quizalofop-P-ethyl) Select 0.5 (Clethodim) Focus Ultra 1.0 - 2.0 (Cycloxydim) Aramo 1.0 - 2.0 (Tepaloxymid), Aufbrauch- frist: 30.11.2018			Ab Zweiblattstadium der Hirsen auch Teilflächenbehandlung möglich. Wartefristen: 4 Wochen
Anmerkung! Fusilade Max hat eine Wartefrist von 8 Wochen und darf deshalb in Erbsen nicht mehr angewendet werden!						
Erbsenblattrandkäfer Nebenwirkung: Kar- toffelkäfer	Fastac Perlen 0.07 (alpha-Cypermethrin) Fury 10 EW 0.15 Decis Protech 0.8 (Deltamethrin) Karate Zeon, 0.1 (Lambda-Cyhalothrin) Talstar SC 0.25 (Bifenthrin)					Eine Applikation kann mit der Herbizidbe- handlung kombiniert werden. Anwendung ausserhalb des Bienenfluges Max. 2 Behandlungen/Jahr WF. 2 Wochen Karate: Max. 2 Beh./Jahr WF. 1 Woche Talstar:Max 1 Beh./Jahr WF. 3 Tage
Blattläuse			Pirimor, Pirimicarb 0.15-0.3 (Pirimicarb)			Wartefrist: 1 Woche
Kartoffelkäfer Bekämpfung nach der Blüte			Gazelle SG Basudin SG, Oryx Pro 0.1 (Acetamiprid) Techno, Ravane 50, Tak 50 EG 0.2 Käfer sind evtl. Resistent (Lambda-Cyhalothrin) Talstar SC 0.25 (Bifenthrin) Für Notfälle aufbewahren			Wartefrist: 2 Wochen Wartefrist: 1 Woche Maximal 1Behandlung pro Kultur und Jahr Wartefrist: 3 Tage