











Empfohlene Pflanzenschutzmittel im Verarbeitungsgemüse für die Saison 2018

Pariserkarottenanbau

In Zusammenarbeit der SCFA (Swiss Convenience Food Association) und des VSGP (Verband Schweizer Gemüseproduzenten)

Problem	 Saat	 2 - 4 Blatt	 6 Blatt	 8 Blatt	 Abreife	Bemerkungen	
	Metric 0.9 + Stomp SC, Stomp Aqua, Sitradol-SC; Hysan; Terapur 2.0 – 3.0 (Metribuzin, Clomazone, Pendimethalin)					Aufwandmengen Pendimethalin: Sandige Böden 2 l Schwere Böden 3 l	
Samenunkräuter zum Teil Gräser	Afalon 1.0 (Linuron)	Aufbrauchfrist: 30.04.2018				Bis 3 Tage nach der Saat anwenden.	
	VA Behandlung	Afalon 1.0 (Linuron)	Aufbrauchfrist: 30.04.2018				Bei erfolgter Voraufbehandlung max. 1.0 kg bzw. 1.0 l/ha anwenden.
		Afalon 1.5 – 2.5 (Linuron)	Aufbrauchfrist: 30.04.2018				Ab Dreiblattstadium der Pariser Karotten einsetzen. Niedrig-Dosierungs-Verfahren: 2 bis 3 mal splitten 0.5 l/ha + 0.5 l/ha Netzmittel.
		Bandur 0.50 (Aclonifen)				Im Nachauflauf 0.5 l ab 3 Blattstadium	
	Metribuzin-produkte (Metribuzin)				Anwendung ab 4 Blattstadium einmalig oder im Splittverfahren. Aufwandmengen herstellerepezifisch. Gute Wirkung auf Ehrenpreis.		

Rückseite beachten

Problem	 Saat	 2 - 4 Blatt	 6 Blatt	 8 Blatt	 Abreife	Bemerkungen
Gräser	Fusilade Max 1.5 (Fluazifop-butyl) Agil 0.75 - 1.0 (Propanilzaafop) Gallant 535 0.4 - 0.5 (Haloxifopmethylester) Targa Super 0.75-1.25 (Quizalofop-P-ethyl) Focus Ultra (Cycloxydim) 1.0 - 2.0					Wartefristen 4 Wochen
	Aramo 1.0 - 2.0 (Tepaloxymid) Aufbrauchfrist: 30.11.2018					1 l bei einjährigen, 2 l bei mehrjährigen Gräsern + Rispengras
	Select 0.5-1.0 (Clethodim)					Nur gegen Quecken 1.0 l erlaubt Wartefrist: 8 Wochen
Alternaria	Moon Experience 0.75 (Fluopyram, Tebuconazole)					Nur 2 Behandlung Wartefrist: 2 Wochen
	Moon Sensation 0.5 (Fluopyram, Trifloxystrobin)					Nur 2 Behandlung Wartefrist: 2 Wochen
	Signum 1.0 (Boscalid, Pyraclostrobin)					Nur 1 Behandlung Wartefrist: 2 Wochen
Schnecken	Schneckenkörner (Metaldehyd)					Nur befallene Stellen behandeln