









Empfohlene Pflanzenschutzmittel im Verarbeitungsgemüse für die Saison 2018

Spinatanbau

In Zusammenarbeit der SCFA (Swiss Convenience Food Association) und des VSGP (Verband Schweizer Gemüseproduzenten)

Problem	 Saat	 Keimblatt	 2 - 4 Blatt	 Erntereif	Bemerkungen
Unkräuter im Vorauflauf	Centium 36 CS 0.15 (Clomazone) + Venzar 0.5 - 0.6 (Lenacil)				Nicht in Sandböden einsetzen! Centium nicht überdosieren Gefahr von Blattaufhellungen! (Chlorose) Je nach Bodenart und Jahr könnten bei Venzar > 0.5 kg /ha Nachbauprobleme auftreten.
	Venzar, Spark, Lenacil 1.0 - 1.5 (Lenacil)				Wegen Nachbauprobleme nur im Winterspinat einsetzen.
	Goltix 700 SC 2 .0 (Metamitron)				Es sind die vom Bewilligungsinhaber festgelegten Vorsorgemassnahmen einzuhalten.
	Oblix 200 EC 2.0 (Ethofumesat)				Keine Anwendungen im Herbst und Winter. Gefahr von Kulturschäden bei Anwendungen auf leichten Böden
Unkräuter im Nachauflauf	Phenmedipham-Produkte 0.8 - 3.0 (Phenmedipham)		Behandlung im Splitverfahren: 2 x 0.8 – 1.5 im Abstand von 4 - 5 Tagen. 1. Behandlung im frühen Keimblattstadium der Unkräuter, Beginn Zwei- Blattstadium des Spinates. Im Winterspinat einmalig 3.0 l/ha. Nur am Abend spritzen. Wartefrist: 3 Wochen		

Rückseite beachten

Problem	 Saat	 Keimblatt	 2 - 4 Blatt	 Erntereif	Bemerkungen
Gräser, Hirsen, Ausfallgetreide			Agil 0.75 - 1.0 (Propaquizafop) Gallant 535 0.3-0.4 (Haloxyfop-methylester) Fusilade Max 1.5 (Fluazifop-butyl) Focus Ultra 1.0 - 2.0 (Cycloxydim)		Keine Queckenbekämpfung. Wartefristen: Agil Focus Ultra 3 Wochen andere 4 Wochen
Erdraupen			Audienz 0.2 – 0.4 (Spinosad) Fastac Perlen 70 g (alpha-Cypermethrin) Karate Zeon, 0.1 (Lambda-Cyhalothrin)		Wartefristen: 1 Woche
Blattläuse			Pirimor 0.3 - 0.5 (Pirimicarb)		Wartefrist: 2 Wochen
Schnecken	Metaldehyd-Schneckenkörner				Nur befallene Stellen behandeln Auf den Boden zu streuen. Keine essbaren Pflanzenteile bestreuen.
Mehltau			Ridomil Gold 2.5 (Metalaxyl-M + Mancozeb)		Behandlung im 4 bis Beginn 6 Blattstadium Wartefrist 2 Wochen Winterspinat 3 Wochen
			Previcur Energy 1.5 – 2.5 (Propamocarb-Fosetyl)		Wartefrist: 2 Wochen
			Forum 1.0 (Dimethomorph) (Alternative für eine zweite Behandlung)		Wartefrist 2 Wochen Winterspinat 3 Wochen.
Mehltau Papierflecken			Bion 40 - 60 g (Acibenzolar-S-methyl)		1. Behandlung im 4 bis Beginn 6 Blattstadium . 2. Behandlung 7 bis 10 Tage später Wartefrist: 1 Woche